

CUIDADOS GERAIS COM DRENO DE TÓRAX

- Sempre que for manipular o dreno, lavar as mãos, secar e aplicar álcool gel 70%. Clampear o dreno, para que não haja entrada de ar, e lembrar de soltar o clamp ao término da manipulação.
- Manter o selo d'água com 500 ml de SF 0,9% (2,5 cm de altura), e trocá-lo a cada 12 horas. Posicioná-lo no piso, com suporte próprio, ou sustentando em local adequado;
- Nunca o elevar acima do tórax sem que esteja clampeado (fechado). Manter a pinça do dreno sempre abaixo do nível da cintura ou do leito do paciente;
- Mensurar o débito do dreno a cada 1 hora, ou menos, caso haja drenagem superior a 100 ml/hora. Colocar uma fita adesiva ao lado da graduação do frasco. Sempre registrar o aspecto do líquido (Ex: seroso, sero-hemático, hemático, purulento);
- Inspeção e troca diária do curativo;
- Verificar a oscilação na coluna líquida: deve subir na inspiração, e descer na expiração. Caso não haja esse movimento espontâneo, pode haver obstrução do tubo;
- **“Ordenhar” ou massagear a tubulação, na direção de saída (frasco coletor), de 1/1 hora;**
- Atentar para a presença de vazamento e/ou risco de desconexão;
- Manter a cabeceira do leito relativamente elevada, para facilitar a drenagem;
- A fixação pode ser do tipo meso (lateral), com distância de 2 cm entre o dreno e a pele, ou conforme protocolo da instituição;
- Atentar para a presença de bolhas no frasco de drenagem, que podem ser indicativos de fístula aérea;
- Manter o dreno sob aspiração contínua, se indicado. A intensidade da aspiração do sistema é determinada pela quantidade de água no frasco de aspiração contínua, e não pela frequência de borbulhamento.

CUIDADOS NO TRANSPORTE

- Cuidado na passagem entre macas, pois o dreno pode ficar preso e/ou ser arrancado;
- Atenção para que a extremidade de drenagem não fique fora d'água;
- Não ocluir o dreno durante o transporte;

CRITÉRIOS PARA RETIRADA DO DRENO DE TÓRAX

- Drenagem inferior a 100ml /24 horas (adulto);
- Líquido seroso;
- Ausência de bolhas de ar;
- Melhoria do padrão respiratório e da expansibilidade pulmonar.

